

Espécies de Cogumelos*

Forma típica de cogumelo: *Panaeolus sphinctrinus* (Fr.) Qué.

Nome comum Paneolo
Comestibilidade Tóxico (distúrbios neurológicos)

Características Macroscópicas

Chapéu

Forma Jovem: Ovóide
Maduro: Campanulado, por vezes com uma pequena papila central
Dimensão 0,4-5 cm (diâmetro)
Cores Jovem: Castanho-acinzentado, cinzento-oliváceo ou cinzento-pálido
Maduro: Castanho-acinzentado, cinzento-oliváceo ou cinzento-pálido

Ornamentações Liso
Textura Mate ou ligeiramente brilhante
Margem Apendiculada com vestígios de véu, na forma de dentes, membranosos e brancos

Himénio

Tipo Lâminas
Inserção no Pé Adnado
Cores Jovem: Acinzentado
Maduro: Acinzentado, depois acinzentado-negro e finalmente negro
Coloração da Esporada Negra

Pé

Forma Cilíndrico
Dimensão 4-14 cm (comprimento) x 0,1-0,4 cm (largura)
Cores Castanho-acinzentado, cinzento, bege ou ocre-avermelhado
Ornamentações Pruinoso

Anel

Posição e Forma Ausente
Resistência e Textura Ausente
Cores Ausente
Ornamentações Ausente

Volva

Resistência e Textura Ausente
Forma Ausente
Cores Ausente

Outras Estruturas Externas

Látex Ausente
Cortina Ausente

Estruturas Internas

Carne | **Coloração** Creme ou acinzentada
Textura Fibrosa
Consistência Frágil



Carpóforo



Esporos

Características Microscópicas

Esporos

Cores Castanhos-avermelhados
Forma Elípticos, amigdaliformes ou citriformes
Ornamentação Lisos
Dimensão 13,0-18,5 x 9,0-11,0 µm

Outras

Queilocistídios Cilíndricos, sub-capitados
Cutícula Himeniforme, constituída por células piriformes ou claviformes

Características Organolépticas

Textura - Chapéu Seca
Textura - Pé Seca
Cheiro Inapreciável
Sabor Inapreciável

Ecologia

Distribuição Muito frequente

Habitat Prados e pastagens, em excrementos

Modo de Nutrição Sapróbico

Período de Frutificação Outono e Primavera

[« Lista de espécies](#)