

Espécies de Cogumelos*

Forma típica de cogumelo: *Tricholoma equestre* (L.) P. Kumm.

Nome comum Tortulho, canário, miscaro-amarelo
Comestibilidade Suspeito de toxicidade

Características Macroscópicas

Chapéu

Forma Jovem: Campanulado a hemisférico
Maduro: Convexo-aplanado com um umbo obtuso ou ligeiramente deprimido

Dimensão 4-14 cm (diâmetro)

Cores Jovem: Amarelo, amarelo-alaranjado ou ocráceo, com tonalidades castanhas-oliváceas ou avermelhadas
Maduro: Amarelo, amarelo-alaranjado ou ocráceo, com tonalidades castanhas-oliváceas ou avermelhadas

Ornamentações Com escamas acastanhadas e finas, dispostas concêntricamente

Textura Mate

Margem Lisa

Himénio

Tipo Lâminas

Inserção no Pé Adnado ou ligeiramente decorrente

Cores Jovem: Amarelo-intenso a amarelo-limão
Maduro: Amarelo-intenso a amarelo-limão

Coloração da Esporada Branca

Pé

Forma Cilíndrico, ligeiramente claviforme ou bolboso

Dimensão 5-10 cm (comprimento) x 1-2 cm (largura)

Cores Amarelo ou amarelo-acastanhado

Ornamentações Com fibrilhas longitudinais

Anel

Posição e Forma Ausente

Resistência e Textura Ausente

Cores Ausente

Ornamentações Ausente

Volva

Resistência e Textura Ausente

Forma Ausente

Cores Ausente

Outras Estruturas Externas

Látex Ausente

Cortina Ausente

Estruturas Internas

Carne | **Coloração** Esbranquiçada ou amarelada
Textura Fibrosa
Consistência Normal



Carpóforo



Esporos

Características Microscópicas

Esporos

Cores Hialinos

Forma Elípticos

Ornamentação Lisos

Dimensão 6,0-8,5 x 4,0-5,5 µm

Outras

Queilocistídios Ausentes

Cutícula Filamentosa, constituída por hifas mais ou menos paralelas

Características Organolépticas

Textura - Chapéu Seca ou ligeiramente viscosa

Textura - Pé Seca

Cheiro Farinhoso ou fúngico

Sabor Doce

Ecologia

Distribuição Muito frequente

Habitat Pinhais

Modo de Nutrição Micorrízico

Período de Frutificação Outono e Inverno

[« Lista de espécies](#)