



Espécies de Cogumelos*

Forma típica de cogumelo: *Boletus aereus* Bull.

Nome comum Tortulho, Boletó negro	
Comestibilidade Excelente comestível	
Características Macroscópicas	
Chapéu	
Forma Jovem: Hemisférico Maduro: Convexo a convexo-aplanado	
Dimensão 7-20 cm (diâmetro)	
Cores Jovem: Castanho-escuro a castanho-negro Maduro: Castanho-escuro a castanho-negro	
Ornamentações Finamente pubescente	
Textura Mate	
Margem Lisa	
Himénio	
Tipo Tubos/ poros pequenos e circulares	
Inserção no Pé Livre a sub-livre	
Cores Jovem: Tubos e poros esbranquiçados, amarelados a esverdeados Maduro: Tubos e poros esbranquiçados, amarelados a esverdeados	
Coloração da Esporada Castanha-olivácea ou amarela-olivácea	
Pé	
Forma Claviforme ou ventruado	
Dimensão 5-12 cm (comprimento) x 2-5 cm (largura)	
Cores Amarelo-claro, castanho-claro, castanho-ocráceo ou castanho-avermelhado	
Ornamentações Com um retículo pequeno, esbranquiçado ou acastanhado	
Anel	
Posição e Forma Ausente	
Resistência e Textura Ausente	
Cores Ausente	
Ornamentações Ausente	
Volva	
Resistência e Textura Ausente	
Forma Ausente	
Cores Ausente	
Outras Estruturas Externas	
Látex Ausente	
Cortina Ausente	
Estruturas Internas	
Carne	Coloração Branca
	Textura Fibrosa
	Consistência Normal
Características Microscópicas	
Esporos	Cores Amarelos
	Forma Fusiformes a elípticos
	Ornamentação Lisos
	Dimensão 12,0-16,0 x 4,0-5,5 µm
Outras	Queilocistídios Fusiformes
	Cutícula Tricodérmica
Características Organolépticas	
Textura - Chapéu Seca, aveludada	
Textura - Pé Seca	
Cheiro Agradável	
Sabor Agradável	

Carpóforo

Esporos

Distribuição Frequente

Habitat Azinhais e sobreirais

Modo de Nutrição Micorrízico

Período de Frutificação Outono

[« Lista de espécies](#)