

Espécies de Cogumelos*

Forma típica de cogumelo: *Macrolepiota procera* var. *procera* (Scop.) Singer

Nome comum Parasol, frades, púcaras, marifusa, gasalho, roca
Comestibilidade Excelente comestível

Características Macroscópicas

Chapéu

Forma Jovem: Globoso a ovóide
Maduro: Convexo a plano, com um umbo central

Dimensão 10-30 cm (diâmetro)

Cores Jovem: Castanho escuro no centro e progressivamente castanho mais claro até à margem, sobre um fundo branco ou creme
Maduro: Castanho escuro no centro e progressivamente castanho mais claro até à margem, sobre um fundo branco ou creme

Ornamentações Com escamas acastanhadas, grandes, circulares e destacáveis, dispostas concêntricamente

Textura Mate

Margem Lisa ou provida de alguns apêndices



Carpóforo

Himénio

Tipo Lâminas

Inserção no Pé Livre

Cores Jovem: Esbranquiçado ou creme e, por vezes, com tonalidades rosadas
Maduro: Esbranquiçado ou creme e, por vezes, com tonalidades rosadas

Coloração da Esporada Branca ou ligeiramente rosada



Esporos

Pé

Forma Cilíndrico, com a base mais larga

Dimensão 10-40 cm (comprimento) x 1-3 cm (largura)

Cores Castanho-pálido acima do anel, e castanho-uniforme ou castanho-escuro sobre fundo esbranquiçado a creme, abaixo do anel

Ornamentações Com escamas acastanhadas, que se dispõem irregularmente, em zig-zag

Anel

Posição e Forma Móvel e duplo

Resistência e Textura Persistente e membranoso

Cores Branco na superfície superior e escuro na superfície inferior

Ornamentações Escamoso na face inferior

Volva

Resistência e Textura Ausente

Forma Ausente

Cores Ausente

Outras Estruturas Externas

Látex Ausente

Cortina Ausente

Estruturas Internas

Carne | **Coloração** Branca
Textura Fibrosa
Consistência Normal

Características Microscópicas

Esporos

Cores Hialinos

Forma Elípticos

Ornamentação Lisos

Dimensão 12,5-20,0 x 8,5-13,0 µm

Outras

Queilocistídios Claviformes

Cutícula Tricodérmica, constituída por hifas cilíndricas septadas

Características Organolépticas

Textura - Chapéu Seca
Textura - Pé Seca
Cheiro Agradável
Sabor Doce, a nozes ou avelãs

Ecologia

Distribuição Muito frequente
Habitat Prados e pastagens; Matos; Azinhais e sobreirais
Modo de Nutrição Sapróbio
Período de Frutificação Outono

[« Lista de espécies](#)