



Espécies de Cogumelos*

Forma típica de cogumelo: *Amanita ponderosa* Malençon & R. Heim

Nome comum Silarca		
Comestibilidade Excelente comestível		
Características Macroscópicas		
Chapéu		
Forma Jovem: Hemisférico Maduro: Convexo a plano		
Dimensão 8-13 cm (diâmetro)		
Cores Jovem: Branco Maduro: Ocre-rosado ou castanho-avermelhado		
Ornamentações Liso		
Textura Mate		
Margem Lisa		
Himénio		
Tipo Lâminas		
Inserção no Pé Livre		
Cores Jovem: Branco Maduro: Creme		
Coloração da Esporada Branca		
Pé		
Forma Com base bulbosa		
Dimensão 4-10 cm (comprimento) x 2-4 cm (largura)		
Cores Branco ou rosado		
Ornamentações Ligeiramente floculoso		
Anel		
Posição e Forma Descendente e simples		
Resistência e Textura Fugaz e membranoso		
Cores Branco		
Ornamentações Liso		
Volva		
Resistência e Textura Persistente, membranosa e espessa		
Forma Saciforme (forma de saco)		
Cores Branca, mas sempre manchada de terra		
Outras Estruturas Externas		
Látex Ausente		
Cortina Ausente		
Estruturas Internas		
Carne	Coloração Branca ou rosada quando exposta ao ar ou pressionada	
	Textura Fibrosa	
	Consistência Normal	
Características Microscópicas		
Esporos		
Cores Hialinos		
Forma Elípticos		
Ornamentação Lisos		
Dimensão 10,0-13,0 x 7,0-8,0 µm		
Outras		
Queilocistídios Ausentes		
Cutícula Filamentosa e gelifcada, constituída por hifas paralelas		
Características Organolépticas		
Textura - Chapéu Seca		
Textura - Pé Seca		
Cheiro Terroso		
Sabor Fraco		

Ecologia

Distribuição Pouco frequente

Habitat Azinhais e sobreirais

Modo de Nutrição Micorrízico

Período de Frutificação Primavera

[« Lista de espécies](#)